


医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

<p>名称</p>	<p>デイトナS</p>	<p>(商品画像)</p> 
<p>第②類 医薬品</p>		
<p>成分・分量</p>	<p>1日量(2カプセル)中 ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg</p> <p>添加物として、クロスポビドン、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、小麦胚芽油、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色三酸化鉄を含有しています。</p>	
<p>用法・用量</p>	<p>寝つきが悪い時や眠りが浅い時、下記の1回量を1日1回、就寝前に服用してください。 大人(15才以上) 2カプセル</p>	
<p>効能・効果</p>	<p>一時的な不眠の次の諸症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い</p>	
<p>してはいけないこと</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないでください。             <ol style="list-style-type: none"> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>15才未満の小児</li> <li>日常的に不眠の人</li> <li>不眠症の診断を受けた人</li> </ol> </li> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</li> <li>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気をもよおして事故を起こすことがあります。また、本剤の服用により、翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じる場合には、これらの症状が消えるまで、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。)</li> <li>授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合には授乳を避けてください。</li> <li>服用時は飲酒しないでください。</li> <li>寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないでください。</li> </ol>	
<p>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>医師の治療を受けている人</li> <li>高齢者(高齢者では眠気が強くあらわれたり、また、反対に神経が高ぶるなどの症状が現れることがあります。)</li> <li>薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>次の症状のある人:排尿困難</li> <li>次の診断を受けた人:緑内障、前立腺肥大</li> </ol>	
<p>その他</p>		
<p>店名</p>		

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談ください。