

医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

名称	フストールシロップ
----	-----------

第②類 医薬品

成分・分量	<p>100mL中 ジヒドロコデインリン酸塩 50mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 125mg, グアヤコールスルホン酸カリウム 450mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩 20mg, 無水カフェイン 200mg,</p> <p>添加物として、クエン酸Na、白糖、D-ソルビトール、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料を含有しています。</p>
-------	---



用法・用量	<p>下記の1回量を添付の計量コップにとり、1日3～4回服用してください。 なお、場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用しても差し支えありません。 大人(15才以上) 10mL, 12才以上15才未満 6.6mL, 12才未満は服用しないこと。</p>
-------	--

効能・効果	せき、たん
してはいけないこと	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 過量服用・長期連用しないでください。
次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください	<ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人 妊婦又は妊娠していると思われる人 高齢者 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 次の症状のある人: 高熱、排尿困難 次の診断を受けた人: 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
その他	
店名	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談ください。