


医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

<p>名称</p>	<p>フストールシロップA</p>	<p>(商品画像)</p> 
<p>第2類 医薬品</p>		
<p>成分・分量</p>	<p>60mL中          トリメトキノール塩酸塩 6mg, クロルフェニラミンマ          レイン酸塩 12mg, リゾチーム塩酸塩 60mg (力          価), セネガ流エキス 1mL</p> <p>添加物として、エデト酸Na、クエン酸、白糖、D-ソ          ルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタ          ノール、パラベン、安息香酸Na、香料、赤色102号          を含有しています。</p>	
<p>用法・用量</p>	<p>下記の1回量を添付の計量コップにとり、1日4回毎食後及び就寝前に服用してください。          なお、場合によっては、約4時間の間隔を置いて1日6回まで服用しても差し支えありません。          大人(15才以上) 10mL, 11才以上15才未満 6. 6mL, 8才以上11才未満 5. 0mL, 5才以上8才未満          3. 3mL, 3才以上5才未満 2. 5mL, 1才以上3才未満 2. 0mL, 3ヵ月以上1才未満 1. 0mL,</p>	
<p>効能・効果</p>	<p>せき、ぜんそく、たん</p>	
<p>してはいけない こと</p>	<p>1. 次の人は服用しないでください          (1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人          2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。          他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、ア          レルギー用薬等)          3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)</p>	
<p>次の人は服用前 に医師、薬剤師 又は登録販売者 に相談してくだ さい</p>	<p>(1) 医師の治療を受けている人          (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人          (3) 乳児(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシ          ー)があらわれたとの報告があります。)          (4) 高齢者          (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人          (6) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難          (7) 次の診断を受けた人: 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害</p>	
<p>そ の 他</p>		
<p>店 名</p>		

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談ください。