


医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

<p>名称</p>	<p>ラキサタンA</p>	<p>(商品画像)</p> 
<p>第2類 医薬品</p>		
<p>成分・分量</p>	<p>3錠(1日最大服用量)中 ビサコジル 15.00mg 添加物として、乳糖、セルロース、CMC-Ca、マクロゴール、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、アラビアゴム、ゼラチン、タルク、白糖、炭酸Ca、CMC-Na、カルナウバロウ、サラシミツロウ、赤色3号を含有しています。</p>	
<p>用法・用量</p>	<p>下記の1回量を1日1回、就寝前又は空腹時にかみくだかずに服用してください。 ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら増量又は減量してください。 2～3日便通がないとき:成人(15歳以上) 1～2錠, 11歳以上15歳未満 1錠 4日以上便通がないとき:成人(15歳以上) 2～3錠, 11歳以上15歳未満 1～2錠 本剤の服用前後1時間以内に牛乳又は制酸剤の服用を避けてください。</p>	
<p>効能・効果</p>	<p>便秘 便秘に伴う次の諸症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔</p>	
<p>してはいけないこと</p>	<p>1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の瀉下薬(下剤・便秘薬) 2. 大量に服用しないでください。</p>	
<p>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>	<p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 次の症状のある人 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐</p>	
<p>その他</p>		
<p>店名</p>		

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談ください。