

医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

<p>名称</p>	<p>オムニン鼻炎カプセルS</p>	<p>(商品画像)</p> 
<p>第②類 医薬品</p>		
<p>成分・分量</p>	<p>1日量(6カプセル)中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6.0mg, ベ ラドンナ総アルカロイド 0.4mg, プソイドエフェド リン塩酸塩 120.0mg, 無水カフェイン 120.0m g, 添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツ ロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グ リセリン、酸化チタンを含有しています。</p>	
<p>用法・用量</p>	<p>下記の1回量を1日3回、食後水又は温湯で服用してください。 大人(15才以上) 2カプセル、7才以上 15歳未満 1カプセル</p>	
<p>効能・効果</p>	<p>急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ 目、のどの痛み、頭重</p>	
<p>してはいけない こと</p>	<p>1. 次の人は服用しないでください。 (1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 次の症状がある人: 前立腺肥大による排尿困難 (3) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー 一用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症 状があらわれることがあります。) 5. 長期連用しないでください。</p>	
<p>次の人は服用前 に医師、薬剤師 又は登録販売者 に相談してくだ さい</p>	<p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 乳児(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシ ー)があらわれたとの報告があります。) (4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難 (7) 次の診断を受けた人: 緑内障 (8) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人</p>	
<p>その他</p>		
<p>店名</p>		

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談ください。